Ces tests sont réalisés au laboratoire sur rendez-vous.
S'assurer avant de prendre le rendez-vous que le produit à injecter est en stock ou si le client doit apporter le produit. L'ordonnance sert à la délivrance du produit et à la réalisation du test.

TEST LHRH

But du test	Exploration de la réserve hypophysaire en gonadotrophine. Chez la femme le test doit être réalisé en début de phase folliculaire (j2-j5).
	Dosages : FSH et/ou LH
Protocole	Prélèvement à T0 mn, Injection IV de 100µl de STIMU-LH (2 ampoules) Prélèvement à T+30, T+60 (T+90 et T+120mn),
Délai de réalisation	1 jour

TEST à la TRH

But du test	Exploration de la sécrétion de prolactine et des fonctions thyréotropes
	Dosages : TSH et/ou PROLACTINE
Protocole	Prélèvement à T-15 (uniquement pour la prolactine) et T0 mn Injection IV lente de STIMU-TSH à 250 µg Prélèvement à T+15, T+30, T+60 mn et éventuellement T+90 et T+120 mn
Délai de réalisation	1 jour

TEST au SYNACTHENE IMMEDIAT (test de THORN)

But du test	Exploration des fonctions surrénaliennes
	Dosages : CORTISOL
Protocole	Sujet **à jeun** depuis 12h et au repos depuis 15 mn, Prélèvement à T0 **à 8h**, Injection IM ou IVL d'une ampoule de Synacthène immédiat* (0,25 mg), Prélèvement à T+30 et T+60 mn
Délai de réalisation	1 jour

TEST au DECTANSYL

But du test	Mise en évidence d'un hypercoticisme
	Dosages : CORTISOL et/ou ACTH
Protocole	Prélèvement J0 **à 8h**, Ingestion de 1 mg de dexaméthasone à minuit, Prélèvement à **J+1 à 8h**,
Délai de réalisation	1 j pour le cortisol, 3 j pour l'ACTH

TEST au SULPIRIDE

But du test	Test de stimulation de la prolactine par le Dogmatil **Dosages : PROLACTINE**
Protocole	Test à réaliser **entre 8 et 12h** Repos allongé de 15mn Prélèvement T-40mn, T-20, T0 puis injection IM de Dogmatil (1 mg/kg), T+20, T+40.
Délai de réalisation	1 jour

TEST POST- COÏTAL ou TEST DE HÜHNER

But du test	Etude de l'interaction dynamique de la glaire cervicale vis-à-vis des spermatozoïdes du conjoint
Protocole	période pré-ovulatoire pour la femme (J12, J13, J14 ; J15) ○ 8 à 10 heures après le rapport sexuel ○ après 3 à 5 jours d'abstinence sexuelle pour l'homme ○ ne pas pratiquer de toilette intime
Délai de réalisation	1 jour

TEST A LA SUEUR

But du test	Dépistage de la mucoviscidose
Protocole	Stimulation et Recueil de la sueur au niveau de l'avant-bras Prévoir de rester environ 1h au laboratoire
Délai de réalisation	1 jour

TEST RESPIRATOIRE A HELICOBACTER PYLORI

But du test	Détection de l'Helicobacter pylori, qui a un rôle pathogène reconnu dans la survenue de l'ulcère gastroduodénal.
Protocole	○ Le patient doit se procurer en pharmacie le médicament prescrit par son médecin ○ Sujet **à jeun** depuis plus de 12 heures ○ Ne **pas boire**, ne **pas manger**, ne **pas fumer** ○ Arrêt du traitement antibiotique au moins 4 semaines avant le prélèvement ○ Arrêt des anti-sécrétoires au moins 15 jours avant le prélèvement ○ Arrêt des pansements gastriques depuis 1 semaine Prévoir de rester environ 3/4h au laboratoire.
Délai de réalisation	1 jour

Les tests suivants sont réalisés sans rendez-vous :

HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE

But du test	Exploration fonctionnelle du pancréas endocrine
	Dosages : GLYCEMIE et/ou INSULINE
Protocole	Sujet **à jeun** depuis 12h, Prélèvement à T0, Vérification de la glycosurie Ingestion de 75 g ou 100 g de glucose anhydre, Prélèvement à T+30, T+60, T+90, T+120, T+180, Urines à T0, T60, T120, T180
Délai de réalisation	1 jour

HYPERGLYCEMIE SIMPLIFIEE OMS

But du test	Diagnostic du diabète gestationnel
	Dosages : GLYCEMIE
Protocole	Sujet **à jeun** depuis 12h, Prélèvement à T0, Vérification de la glycosurie Ingestion de 75 g de glucose anhydre Prélèvement à T+T60+T120 **(selon prescription médicale)**
Délai de réalisation	1 jour

TEST d'O'SULLIVAN

But du test	Dépistage précoce du diabète gestationnel
	Dosages : GLYCEMIE
Protocole	Glycémie à T0, **sujet à jeun ou non (vérification de la glycourie)** Ingestion de 50g de glucose, Prélèvement à T+60
Délai de réalisation	1 jour

TEST de NORDIN

But du test	Etude de la résorption osseuse
	Dosages : CALCIURIE, CREATININURIE éventuellement HYDROXYPROLINURIE
Protocole	Le sujet à jeun depuis la veille, vide sa vessie à 8h, Ingestion de 250ml d'eau, Recueil des urines émises entre 8h et 10h
Délai de réalisation	1 jour